

Prospect: informații pentru utilizator

Prospan 0,7 g/100 ml sirop

Extract uscat din Hederae folium (frunze de iederă)

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Prospan sirop și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Prospan sirop
3. Cum să utilizați Prospan sirop
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Prospan sirop
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Prospan sirop și pentru ce se utilizează

Prospan sirop este un medicament pe bază de plante, care conține extract uscat din frunze de iederă (Hederae folium) ca substanță activă. Prospan sirop aparține unei grupe de medicamente denumite alte antitusive și expectorante.

Prospan sirop este utilizat pentru tratamentul tusei (productive) din afecțiunile inflamatorii de durată (cronice) ale bronhiilor și pentru inflamații acute ale căilor respiratorii însotite de tuse. Prospan sirop este utilizat pentru tratarea tusei la adulți, adolescenți și copii.

Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Prospan sirop

Nu utilizați Prospan sirop:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanța activă (extractul uscat din frunze de iederă (Hederae folium)) sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6)

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Prospan sirop, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Dacă simptomele nu se ameliorează sau dacă apare dificultate la respirație, febră sau expectorație cu puroi sau cu sânge, trebuie să vă adresați de urgență medicului.

Copii

Înainte să utilizați Prospan sirop pentru copii cu vârstă sub 1 an, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Spre deosebire de copiii mai mari, această grupă de vârstă trebuie monitorizată cu atenție atunci când se administrează Prospan sirop, pot să apară diaree și stări de vomă. În acest caz trebuie să vă adresați de urgență medicului. Citiți și informațiile de la punctul 4 (Reacții adverse posibile)

Prospan sirop împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală. Nu au fost efectuate cercetări privind interacțiunea cu alte medicamente. Nu se cunosc până în prezent interacțiuni cu alte medicamente.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptăți, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. Prospan sirop nu este recomandat în timpul sarcinii și alăptării, deoarece nu sunt disponibile informații suficiente despre siguranța administrării la gravide și femei care alăptează.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Acest medicament nu are nici un efect asupra capacitatei de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informații importante privind unele componente ale Prospan sirop

Prospan sirop conține sorbitol (E420)

Dacă este administrat conform instrucțiunilor de dozaj, aportul de sorbitol poate ajunge la 1,9 g pentru fiecare administrare.

2,5 ml de sirop conțin 0,963 g substituent de zahăr (sorbitol) = 0,08 unități de pâine

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

3. Cum să utilizați Prospan sirop

Utilizați întotdeauna Prospan sirop exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul sau asistenta medicală. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Administrare orală

Doza recomandată este:

Vârstă	O singură doză	Doza totală zilnică
Copii sub 1 an	2,5 ml (corespunzând la 17,5 mg extract uscat din frunze de iederă (Hederae folium))	5 ml (2 x 2,5 ml) (corespunzând la 35 mg de extract uscat din frunze de iederă (Hederae folium))
Copii între 1 și 5 ani	2,5 ml (corespunzând la 17,5 mg extract uscat din frunze de iederă (Hederae folium))	7,5 ml (3 x 2,5 ml) (corespunzând la 52,5 mg de extract uscat din frunze de iederă (Hederae folium))

Copii între 6 și 9 ani	5 ml (corespunzând la 35 mg extract uscat din frunze de iederă (Hederae folium))	15 ml (3 x 5ml) (corespunzând la 105 mg de extract uscat din frunze de iederă (Hederae folium))
Adulți și copii peste 10 ani Dacă este necesar, doza pentru adulți poate fi crescută la	5 ml (corespunzând la 35 mg extract uscat din frunze de iederă (Hederae folium)) 7,5 mg (corespunzând la 52,5 mg extract uscat din frunze de iederă (Hederae folium))	15 ml (3 x 5 ml) (corespunzând la 105 mg de extract uscat din frunze de iederă (Hederae folium)) 22,5 ml (3 x 7,5 ml) (corespunzând la 157,5 mg de extract uscat din frunze de iederă (Hederae folium))

Mod de administrare: Pentru administrare orală.

Prospan sirop se administrează dimineața, la prânz și seara.

Siropul se administrează cu măsura dozatoare atașată flaconului. Se recomandă a se agita energetic flaconul înainte de utilizare.

Durata tratamentului este funcție de tipul și gravitatea bolii; tratamentul trebuie efectuat cel puțin o săptămână, chiar și în cazul inflamațiilor ușoare ale tractului respirator.

Este recomandat să continuați tratamentul 2-3 zile după dispariția simptomelor.

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă efectul acestui medicament este mai mare sau mai mic decât vă așteptați.

Dacă utilizați mai mult Prospan sirop decât trebuie

Nu depășiți doza recomandată.

Dacă ati luat doze mai mari (mai mult de 3 ori doza zilnică recomandată) este posibil să apară grija, vărsături și diaree.

Adresați-vă imediat unui medic, pentru a primi tratamentul corespunzător.

Dacă uitați să utilizați Prospan sirop

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Continuați administrarea conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului.

Dacă încetați să utilizați Prospan sirop

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse se clasifică în ordinea frecvenței de apariție:

foarte frecvente	afectează mai mult de 1 utilizator din 10
frecvente	afectează 1 până la 10 utilizatori din 100
mai puțin frecvente	afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000
rare	afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000
foarte rare	afectează mai puțin de 1 utilizator din 10000
cu frecvență necunoscută	frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile

AGENȚIA MEDICALĂ
 SI DISPOZITIVELE MEDICALE
MONITORIZARE SI REGULARE A PRODUCATORILOR
 DE MEDICAMENTE SI SUPLEMENTE ALIMENTARE

Foarte rar: după utilizarea medicamentelor care conțin iederă pot să apară reacții alergice: blânde (urticarie), mâncărimi, pete roșietice trecătoare, dificultate la respirație

Mai puțin frecvente: pot să apară greață, vomă, diaree; poate apare efect laxativ datorită conținutului de sorbitol.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse se agravează sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: wwwAMED.md sau e-mail:farmacovigilenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Prospan sirop

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Nu utilizați Prospan sirop după data de expirare înscrisă pe eticheta flaconului și pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Prospan sirop trebuie utilizat în decurs de 3 luni după prima deschidere a flaconului. Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Prospan sirop

Substanța activă este extractul uscat din frunze de iederă (Hederae folium)

100 ml sirop conțin 0,7 g extract uscat din frunze de iederă (Hederae folium) (5 -7,5): 1 Agent de extracție: alcool etilic (etanol) 30% (m/m)

Celelalte componente sunt: sorbat de potasiu, acid citric anhidru, sorbitol soluție 70% (cristalizabilă)(E420), gumă xanthan, aromă de cireșe, apă purificată.

Un termen important pentru a descrie calitatea unui extract este așa-numitul "Raport materie primă -extract". Un raport de 5 - 7,5 : 1 înseamnă că din 5 -7,5 părți materie primă (frunze de iederă) se obține o parte de extract.

Cum arată Prospan sirop și conținutul ambalajului

Soluție siropoasă, ușor opalescentă de culoare maro-deschisă, cu gust dulce de fructe și miros de cireșe.

Cutie cu un flacon din sticlă de culoare brună, a 100 ml sirop și o măsură dozatoare

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG,
Herzbergstraße 3, 61138 Niederdorfelden,
Germania

Fabricantul

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG,
Herzbergstraße 3, 61138 Niederdorfelden,
Germania

Notă: Extractele din plante sunt obținute din plante uscate. Frunzele uscate de iederă sunt întâi prelucrate într-un amestec de apă și alcool, timp în care ingredientele sunt dizolvate din frunze. Acest proces este cunoscut ca extractie. În timpul fazei de uscare, care urmează extractiei, alcoolul dipare complet din extract, astfel încât preparatul rămâne fără alcool. Prospan sirop conține substanță activă provenită din plante. Se poate forma un sediment slab, pe perioada păstrării. Gustul preparatului poate varia ușor. Calitatea produsului nu este afectată.

Acest prospect a fost revizuit în Iunie 2016

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>