

Prospect: Informații pentru consumator / pacient

Tyrosur 1 mg/g gel Tyrothricin

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Luati întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavastră sau farmacistului.
- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Trebuie să discutați cu un medic, dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Tyrosur gel și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tyrosur gel
3. Cum să utilizați Tyrosur gel
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Tyrosur gel
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Tyrosur gel și pentru ce se utilizează

Tyrosur gel este un antibiotic local. Tyrosur gel este utilizat pentru tratamentul rănilor superficiale mici și relativ uscate, suprainfectate bacterian de agenți patogeni sensibili la tirotricină, cum ar fi tăieturi, zgârieturi, excoriații.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tyrosur gel

Nu utilizați Tyrosur gel:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente ale Tyrosur gel.
- nu este indicat pentru aplicarea pe mucoasa nazală.

Aveți grija deosebită când Tyrosur gel

în cazul aplicării în regiunea ochilor: gelul nu trebuie să nimerească în ochi, deoarece poate provoca o senzație de arsură.

Tyrosur gel împreună cu alte medicamente

Nu sunt cunoscute medicamente care afectează activitatea Tyrosur gel. Nu este cunoscut că Tyrosur gel afectează activitatea oricărui alt medicament.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Sarcina

Nu există date care să ateste acțiunea Tyrosur gel la femeile gravide. Nu este cunoscut riscul potențial pentru ființele umane. Din această cauză este recomandat ca Tyrosur gel să nu se folosească în timpul sarcinii.

Alăptarea

Nu este cunoscut dacă clorura de cetilpiridiniu sau tirotricina se excretă în laptele matern. De aceea se recomandă ca Tyrosur gel să nu se folosească în timpul alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu sunt necesare precauții speciale.

Avertizare importantă în ceea ce privește componente specifice ale Tyrosur gel:

Tyrosur gel 1mg/g conține propilenglicol care poate provoca iritație cutanată.

3. Cum să utilizați Tyrosur gel

Utilizați întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Dacă nu este prescris altfel de către medic, doza uzuală este:

Tyrosur gel se aplică în cantitate suficientă de 2-3 ori pe zi.

Modul de administrare

Se aplică pe piele.

Gelul se aplică dimineață (amiază) și seara în cantități suficiente în aşa fel încât gelul să acopere părțile afectate ale pielii.

Pentru răni minore sau inflamații ale pielii pe suprafețe neacoperite ale corpului, nu este necesar niciun bandaj. Pentru răni mai mari sau care supurează se recomandă aplicarea unui bandaj protector, care trebuie schimbat după 1 – 2 zile conform recomandării medicului.

Cât timp trebuie să utilizați Tyrosur gel?

Perioada de tratament depinde de simptomatologia clinică. În cazul în care după o săptămână de tratament nu se observă nici o ameliorare, cereți sfatul medicului dumneavoastră. Vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul, dacă aveți impresia că Tyrosur gel acționează prea puternic sau nu este suficient de puternic.

Dacă utilizați mai mult Tyrosur gel decât trebuie

Nu se așteaptă nicio consecință. Continuați tratamentul conform indicațiilor de dozare. Dacă observați apariția unor simptome neobișnuite, contactați imediat medicul.

Dacă uitați să utilizați Tyrosur gel

Continuați administrarea conform indicațiilor din acest prospect.

Dacă încetați să utilizați Tyrosur gel

Dacă întrerupeți tratamentul cu Tyrosur gel prea repede, nu puteți beneficia de efectul dorit.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Următoarea convenție de frecvență este utilizată la evaluarea reacțiilor adverse:

| | |
|--------------------------|--|
| Foarte frecvente | Cu mai mult de 1 din 10 pacienți |
| Frecvente | 1 până la 10 la 100 de pacienți |
| Mai puțin frecvente: | 1 până la 10 la 1000 de pacienți |
| Rare | 1 până la 10 la 10000 de pacienți |
| Foarte rare | Mai puțin de 1 din 10000 pacienți |
| Cu frecvență necunoscută | Frecvența pe baza datelor disponibile nu pot fi evaluate |

Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat:

Foarte rare: reacții de sensibilizare, respectiv senzația de arsură a pielii.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: wwwAMED.md sau e-mail:farmacovigilenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Tyrosur gel

Nu lăsați acest medicament la vedere și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Produsul se poate utiliza în decurs de cel mult 3 luni după prima deschidere a tubului.

A se păstra la temperaturi sub 25° C.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Tyrosur gel

Substanța activă este tirotricina.

100 g gel conține 0,1 mg tirotricina.

Celelalte componente sunt: etanol 96%, clorură de cetilpiridiniu, propileneglicol, carbomer (Synthalen K), trometamol, apă purificată

Cum arată Tyrosur gel și conținutul ambalajului
Gel incolor, opalescent.

Ambalaj

Cutie cu un tub din Al a 5 g gel.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstr. 3

61138 Niederdorfelden

Germania

Telefon: ++49 6101 539 300

Fax: ++49 6101 539 315

eMail: info@engelhardde

Fabricantul

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstr. 3

61138 Niederdorfelden

Germania

Acvest prospect a fost revizuit în aprilie 2017

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>