

Prospect: Informații pentru consumator / pacient

Tyrosur 1 mg/g pulbere cutanată

Tyrothricin

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Trebuie să discutați cu un medic, dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Tyrosur pulbere și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tyrosur pulbere
3. Cum să utilizați Tyrosur pulbere
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Tyrosur pulbere
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Tyrosur pulbere și pentru ce se utilizează

Tyrosur pulbere este un remediu pentru tratarea rănilor. Tyrosur pulbere este utilizat pentru tratamentul rănilor de dimensiuni mici, superficiale, care supurează ușor, suprainfectate bacterian de agenți patogeni sensibili la tirotricina, cum ar fi tăieturi, zgârieturi, excoriații.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tyrosur pulbere

Nu utilizați Tyrosur pulbere:

-Dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente ale Tyrosur pulbere enumerate la pct. 6.1.

Tyrosur pulbere împreună cu alte medicamente

Nu sunt cunoscute medicamente care afectează activitatea Tyrosur pulbere. Nu este cunoscut că Tyrosur pulbere afectează activitatea oricărui alt medicament.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Sarcina

Nu există date care să ateste acțiunea Tyrosur pulbere la femeile gravide. Tirotricina este

AMENȚULUI
SI DISPOZITIVELOR MEDICALE
MD-2028, mun. Chișinău, str. Karolienko, 2/1
SECȚIA AUTORIZARE MEDICAMENTE
SI SUPLEMENTE ALIMENTARE

substanță activă a Tyrosur pulbere. Nu se știe în ce măsură pătrunde prin piele și este preluat în circulația sanguină. Din acest motiv, dacă sunteți gravidă, trebuie să luați Tyrosur pulbere numai

- pentru scurt timp
- pe o suprafață mică
- dacă vă dă medicul dumneavoastră instrucțiuni pentru a face acest lucru.

Alăptarea

Tirotricina este substanță activă a Tyrosur pulbere. Nu se cunoaște dacă acesta trece în laptele matern. În cazul în care alăptăți, nu puteți utiliza Tyrosur pulbere în zona sânului. În cazul în care alăptăți puteți utiliza Tyrosur pulbere numai:

- pentru scurt timp
- pe o suprafață mică
- dacă medicul dumneavoastră vă dă instrucțiuni pentru a face acest lucru.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu sunt necesare precauții speciale.

3. Cum să utilizați Tyrosur pulbere

Utilizați întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect. Discuțați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Dacă nu este prescris altfel de către medic, doza uzuală este:

Tyrosur pulbere se aplică în straturi subțiri de 1-2 ori pe zi pe zonele afectate ale pielii.

Cum și când trebuie să utilizați Tyrosur pulbere?

Pulbere cutanată

Pulberea se aplică dimineața (și seara), în cantități suficiente pentru a acoperi zonele de piele care urmează să fie tratate. Acestea pot fi apoi acoperite cu un bandaj, dacă este necesar.

Cât timp trebuie să utilizați Tyrosur pulbere?

Perioada de tratament depinde de simptomatologia clinică. Tyrosur pulbere trebuie utilizat timp de aproximativ o săptămână după ce simptomele s-au diminuat, pentru a le opri de la recurențe. Vă rugăm să discuțați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul, dacă aveți impresia că Tyrosur pulbere acționează prea puternic sau nu este suficient de puternic.

Dacă utilizați mai mult Tyrosur pulbere decât trebuie

Nu se așteaptă nici o consecință. Continuați tratamentul conform indicațiilor de dozare. Dacă observați apariția unor simptome neobișnuite, contactați imediat medicul.

Dacă uitați să utilizați Tyrosur pulbere

Continuați administrarea conform indicațiilor din acest prospect.

Dacă încetați să utilizați Tyrosur pulbere

Durata tratamentului depinde de severitatea și evoluția simptomatologiei clinică.

Dacă întrerupeți tratamentul cu Tyrosur pulbere prea repede, nu puteți beneficia de efectul dorit.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, Tyrosur pulbere poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Următoarea convenție de frecvență este utilizată la evaluarea reacțiilor adverse:

Foarte frecvente	Cu mai mult de 1 din 10 pacienți
Frecvente	1 până la 10 la 100 de pacienți
Mai puțin frecvente:	1 până la 10 la 1000 de pacienți
Rare	1 până la 10 la 10000 de pacienți
Foarte rare	Mai puțin de 1 din 10000 pacienți
Cu frecvență necunoscută	Frecvența pe baza datelor disponibile nu pot fi evaluate

Afectiuni cutanate și ale țesutului subcutanat:

Foarte rare: reacții de sensibilizare.

Dacă observați apariția reacțiilor de hipersensibilitate, ar trebui să nu mai utilizați Tyrosur pulbere. Adresați-vă medicului.

Raportarea reacțiilor adverse suspecte

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale căruia detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale:

www.amed.md sau e-mail:farmacovigilenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Tyrosur pulbere

Nu lăsați acest medicament la vedere și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25° C, în ambalaj original.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Tyrosur pulbere

Substanța activă este tirotricina.

100 g pulbere conține 0,1 mg tirotricina

Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, macrogol 6000, dioxid de siliciu înalt dispersat.


Cum arată Tyrosur pulbere și conținutul ambalajului

Tyrosur pulbere este o pulbere de culoare albă friabilă în flacoane de polietilenă.

Produsul este disponibil în ambalaje cu 5 g.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață



Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstr. 3
61138 Niederdorfelden
Germania
Telefon: ++49 6101 539 300
Fax: ++49 6101 539 315
eMail: info@engelhard.de

Fabricantul

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstr. 3
61138 Niederdorfelden
Germania

Acest prospect a fost revizuit în aprilie 2017

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>