

**Prospect: Informații pentru utilizator**

**Trachisan - comprimate de supt**  
 clorhidrat de lidocaină, digluconat de clorhexidină, tirotricina

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 10 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Trachisan – comprimate de supt și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Trachisan – comprimate de supt
3. Cum să utilizați Trachisan – comprimate de supt
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Trachisan – comprimate de supt
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Trachisan – comprimate de supt și pentru ce se utilizează**

Trachisan – comprimate de supt face parte din grupa: produse pentru zona orofaringiană. Antiseptice Medicamentul se poate utiliza pentru :

Inflamații și infecții ale cavităților orală și faringiană (inflamația mucoasei bucale, inflamația gingială și amigdalite). Infecții ale căilor respiratorii superioare, dureri în gât, dificultate la înghițire.

Prioritar, înaintea intervențiilor chirurgicale din cavitățile orală și faringiană (extirparea chirurgicală a amigdalelor, extracții dentare).


Dacă după 10 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Trachisan – comprimate de supt****Nu utilizați Trachisan – comprimate de supt:**

- dacă sunteți alergic la tirotricina, clorhidrat de lidocaină și digluconat de clorhexidină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6.);
- dacă suferiți de descuamare non-hemoragică a mucoasei bucale (modificări erozive și descuamative);
- dacă aveți leziuni (râni) mari, recente, ale cavității orale și faringiene;
- la copii sub 4 ani.

**Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați Trachisan – comprimate de supt, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.



**Sportivi:** Acest medicament conține ca substanță activă și un anestezic local (clorhidratul de lidocaină), care poate determina o reacție fals pozitivă la testele antidoping.

#### **Trachisan – comprimate de supt împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Trebuie evitată utilizarea în același timp sau la intervale foarte scurte de timp a altor antiseptice locale (substanțe antimicrobiene care acționează în cavitatea bucală), datorită posibilității interacțiunii medicamentoase (inactivare, antagonism).

#### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptăți, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Din motive de siguranță, în timpul sarcinii și alăptării, medicamentele se vor administra numai la indicația medicului.

#### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Trachisan - comprimate de supt nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

#### **Trachisan – comprimate de supt conține sorbitol.**

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a utiliza acest medicament.

Dacă sunteți diabetic utilizați cu precauție Trachisan – comprimate de supt deoarece un comprimat de supt conține 0,69 g sorbitol, corespunzător la 0,057 unități glucidice (unități de pâine).

### **3. Cum să utilizați Trachisan – comprimate de supt**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată este de până la 8 comprimate de supt pe zi la adulți și adolescenți și până la 6 comprimate de supt pe zi la copii între 4 – 12 ani.

Lăsați un comprimat de supt să se dizolve lent în gură, la fiecare două ore.

În general simptomele regreseză după câteva zile. Totuși, pentru a asigura succesul terapeutic, Trachisan – comprimate de supt trebuie luat încă 2 – 3 zile după dispariția simptomelor. Dacă după 10 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Utilizarea la copii**

Este contraindicată administrarea la copii cu vîrstă sub 4 ani

#### **Dacă utilizați mai mult Trachisan – comprimate de supt decât trebuie**

Datorită proprietăților farmacologice ale constituenților, nu sunt de așteptat efecte toxice nici chiar după ingestia accidentală a unor mari cantități de Trachisan - comprimate de supt. Tratamentul de elecție după ingerarea unor doze foarte mari este lavajul gastric.

#### **Dacă uitați să utilizați Trachisan – comprimate de supt**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

#### **Dacă incetați să utilizați Trachisan – comprimate de supt**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

În cazuri rare, pot apărea reacții de hipersensibilitate la tirotricină.

Comprimatele de supt nu trebuie administrate pe o perioadă ce depășește 6 săptămâni, fără avizul medicului. În general, Trachisan - comprimate de supt este bine tolerat. Totuși preparatul poate să determine tulburări gustative cu durată de până la o oră, ce dispar complet ulterior. Atunci când este folosit pentru o perioadă mai îndelungată, poate să apară rareori colorarea galbenă spre maronie a limbii și dinților, care poate fi îndepărtată prin igienă orală atentă și tratament stomatologic. Oricum, colorația dispare de la sine atunci când folosirea preparatului este întreruptă.

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nomenclurate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

#### **5. Cum se păstrează Trachisan – comprimate de supt**

Nu lăsați acest medicament la vedere și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25° C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciodată medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

#### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

##### **Ce conține Trachisan – comprimate de supt**

- Substanțele active sunt: tirotricină 0,5 mg, clorhidrat de lidocaină 1,0 mg și digluconat de clorhexidină 1,0 mg
- Celelalte componente sunt: sorbitol, stearat de magneziu (vegetal), ulei de mentă.

##### **Cum arată Trachisan – comprimate de supt și conținutul ambalajului**

Se prezintă sub formă de comprimate de supt de culoare albă, rotunde, plate, cu margini teșite.

Trachisan – comprimate de supt este disponibil în cutii cu 2 blister din PVC/Al a către 10 comprimate de supt.

##### **Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG.,  
Herzbergstr. 3  
61138 Niederdorfelden  
Germania



Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:

SC Mangesius Trading SRL  
Str. Clucerului 62 – 66  
București, 011367, România  
E-mail: office@mangesius.ro

**Acest prospect a fost revizuit în Octombrie 2015.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>