

Autoritate Nationala Competenta: Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, București 011478-RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro

#### UTILIZARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Utilizați COLDISEPT nanoSILVER picături pentru urechi de trei ori pe zi, timp de cel puțin 3 zile după ce simptomele inflamației au dispărut.

Încălziți ușor flaconul (de preferință în mâini).

Întindeți-vă cu urechea orientată în sus.

Aplicați 5 picături (cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră vă recomandă altfel) și rămâneți în această poziție timp de 3-5 minute.






Folosiți sistematic, în funcție de nevoile individuale.

#### CONDIȚII DE PĂSTRARE


A se păstra la o temperatură sub 25 °C, într-un loc uscat, nu lăsați la îndemâna copiilor.


Ambalaj 15 ml

#### SEMNICIFICATIA SIMBOLURILOR:

	LOT
	A se utiliza pana la
	A se citi instructiunile pentru utilizare
	Data fabricatiei
	Producător:
	Limita de temperatura pana la care poate fi expus in siguranta produsul

Data revizuirii textului: 01.09.2020

 ARKONA Laboratorium  
Farmakologii Stomatologicznej,  
Nasutów 99C, 21-025 Niemce,  
Polonia

 Produs în UE pentru:  
Algen Pharma AG,  
Bern, Elveția

